



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية
جامعة ذي قار / كلية التربية للبنات
قسم علوم الحيوان

**العلاقة بين الإسادة الأذنوية والمكتوارات العدقودية الطبيعية في
هرش الروبو**

بعض معجمه إلى مجلس كلية التربية للبنات وهو جزء من

مخطوطة

رسول هفاطنة البكالوريوس في علمي الحياة

من قبل المطالعات:

أ. إبراهيم (خبير دينيميد)

أ. زياد فتحي خبائث

بأشواهد الاصناف

م. د. محمد موسى نعما

2018 م

ـ 1439

summary

الخلاصة

هذه الدراسة حفت الى ايجاد العلاقة بين اصابة الانف بالمكورات العنقودية الذهبية في مرض الريبو وتطور العلامات المسريرية الشديدة لمرض الريبو حيث اجريت هذه الدراسة في مستشفى الحسين التعليمي / مدينة الناصرية والجزء الثاني من التجربة في البيت الحيويي لكلية الزراعة / جامعة سومر للفترة الممتدة من ٢٠١٧/١١/١ - ٢٠١٨/١/٢، حيث جمعت (٢٠) عشرون عينة مسحة انفية من مرض الريبو وتقها الى المختبر بواسطة اتوسط الزراعي الناواق لتشخيص الاصلية البكتيرية تم حفنت هذه البكتيريا في التجويف الانفي للحيوان المختبري الارنب وبعد فترة زمنية (شهرين) ثم سحب (١٠) عشر عينات ثم ووضعها في اذناب اختبار مسنوية خالية من مضادات التخثر للحصول على المصل لغرض قياس الحركيات الخفوية وكذلك الصد وكانت النتائج ظهور الاصابة البكتيرية في التجويف الانفي للأرنب بعد مرور شهرين من الاصلية وكانت مستويات الحركيات الخلوية قد اظهرت ارتفاع مقبول حيث كان مستوى كل من الكاما انترفيرون هو ١٣٧-٥٢٧ اما (36-٣٩-١٣٩) اما مجموعة السيطرة (TL-4-656-03) هو ٤-١٣٩ مجموعة السيطرة (TL-5-425-05) ، اما (TL-13-166) ، اما (TL-13-46) ، اما مجموعة السيطرة (153-405-11) ونستنتج من هذا وجود علاقة وثيقة بين (٦٠٠-٦٠٠) وفي مجموعة السيطرة (405-11) وجود الاصابة الجرثومية لمكورات العنقودية الذهبية مع تطور العلامات المسريرية الشديدة لمرضى الريبو.